Grafici quantili-quantili (Q-Q plot)


I grafici quantili-quantili mettono a confronto i quantili di due distribuzioni.

Per il controllo di normalità della distribuzione

I quantili di una variabile possono essere messi a confronto con quelli della distribuzione normale di una variabile teorica con la stessa media e la stessa deviazione standard.

```
# dati
data(SLID, package = "carData")

qqnorm(SLID$wages)
```




Sull'asse delle X sono rappresentati i quartili della distribuzione normale (i valori attesi in caso di normalità), su quello delle Y i valori campionari (quindi quelli della variabile).

Per disegnare la linea dei valori attesi, e confrontare le due distribuzioni, usiamo la funzione qqline():

```
qqnorm(SLID$wages)
grid() # griglia
```

```
qqline(SLID$wages,
    lwd = 2,  # spessore
    col = "red" # colore
)
```



La linea rossa rappresenta i valori attesi. Se la variabile fosse normale, le due linee coinciderebbero; pertanto:

- Se la distribuzione della variabile ha la forma di una S, la distribuzione è asimmetrica;
- Se invece è al di sotto o al di sopra della linea, la distribuzione è platicurtica (la densità è maggiore sulle code), o leptocurtica (la densità è maggiore del previsto intorno ai valori centrali).

In questo caso, la linea della variabile sale in corrispondenza delle due code: ci sono più casi di quelli attesi nei valori molto bassi e molto alti (ma è asimmetrica verso i valori alti).

Altro

Vedi anche:

- Gestione dei colori
- Titoli
- Etichette e annotazioni
- Parametri grafici

Script di esempio

E' possibile scaricare ed eseguire lo script dell'esempio:

qqplot.R

Grafici, Analisi monovariata

From:

https://www.agnesevardanega.eu/wiki/ - Ricerca Sociale con R

Permanent link:

https://www.agnesevardanega.eu/wiki/r/grafici/qqplot?rev=1747380350

Last update: 16/05/2025 07:25

